

## 病蟲害管理與防治

居家種植蔬菜，由於栽培面積小且種類繁多，使用化學農藥防治難度較高。因此，多採行有機栽培，所以需要掌握下列原則，可減少病蟲害的發生。

- 1 選擇耐熱、抗病蟲之蔬菜種類或品種。
- 2 可利用細目紗網圍蓋以減少害蟲進入機會。
- 3 注意疏苗、通風性良好及適當澆水，避免病害發生。
- 4 利用黃或藍色粘紙誘殺潛蠅、粉蝨、黃條葉蚤及蛾類。
- 5 隨時拔除病株或蟲體，減少傳染及危害。
- 6 採行輪作方式，減少害蟲的機會。
- 7 果菜類可套袋保護。



掛置誘蛾燈



黃色粘紙



各種天然除蟲劑



防蟲網

## 採收及採收後園區的管理

各種蔬菜自播種至收穫之生育日數，因作物種類、品種、栽培時期及風土等影響而有所不同。一般短期葉菜類夏秋季約20至30天，春冬季約30至40天可採收。山芹菜、紅鳳菜、薤菜及韭菜等可宿根栽培者，採收時自離根5公分處割取。

為降低硝酸鹽在植體中累積，除應避免施用過量氮肥外，也應儘量避免在清晨或陰雨天時採收。採收後殘渣應徹底清理乾淨，以減少病蟲害的傳播。採收後土壤應徹底翻犁，並採強日曝曬數天，可減少部份病蟲害的罹病率，同時有助於土壤理化性及生物性的改善。